PRECAUCIONES:
- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INESPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el plaguicida. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de 2,4 D CONTROLER EH en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. Evitar su aplicación durante la época de floración ni No asperjar sobre colmenares en actividad. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. Prácticamente no tóxico para peces. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuague fuera equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Se debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Después de la aplicación drene completamente el circuito del pulverizador (tanque, tuberías, comandos, mangueras, botalón, cono de carga, etc.) y proceda a enjuagarlo o lavarlo. Después de manera segura el caldo remanente drenado y repitiendo las mismas previsiones y medidas que figuran en el párrafo anterior. Enjuague el pulverizador a vez continuas aplicando con el mismo caldo al día siguiente, enjuague el pulverizador para evitar que el líquido remanente permanezca durante toda la noche o por períodos prolongados en el tanque, tuberías comandos, filtros, válvulas antigoteo, barra de pulverización, etc. Utilice agua limpia para hacer el enjuague con un volumen del 10% de la capacidad del tanque y no menor a 200 - 300 l para tanques de más de 2.500 l), haciendo recircular el agua de lavado usando todas las agitadores, duchas de enjuague del tanque y cono de carga, por no menos durante 15 minutos y de ser posible a una presión no menor a 3 bar. Lavado interno del circuito de aspersión. Lave íntegramente todo el circuito de aspersión (tanque, tuberías, comandos, filtros, rejillas, cono mezclador, boquillas, antigoteo, barra de aspersión, etc.), cuando cambie de producto (por riesgo de fitotoxicidad o vaya a no va asegurar trabajando (riesgo de formación de depósitos). Se recomienda el empleo de productos registrados que tengan acción detergente, desincrustante y neutralizante. Se sugiere lavar con un volumen del 10% de la capacidad del tanque (y no menor 200-300 l para tanques de más de 2.500 l), repartido en 3 veces, cada una de no menos de 15 minutos recirculando el agua de lavado empleando los agitadores y las duchas de lavado de tanque y cono de carga, y de ser posible la presión no debe ser inferior a 3 bar. En caso de barras equipadas con tapas fijas en sus extremos, abrirlas para drenar el agua de limpieza luego de cada enjuague. Posteriormente, lave boquillas, filtros, rejillas desmontables y antigoteo por separado. Utilice detergente lavavajillas y cepillo de cerdas suaves. Disponga de manera segura el agua de cada lavado respetando las normas provinciales y municipales vigentes. Posteriormente inspeccione todos los tamices, rejillas, filtros, portapicos, sistemas antigoteo, secciones internas visibles del botalón para asegurarse que no quedan depósitos del caldo de aspersión. Finalmente limpie y enjuague el exterior del pulverizador empleando un sistema presurizado. Se recomienda utilizar productos detergentes fuertes o productos registrados para remover. El enjuague - lavado interno y externo debe realizarse empleando el equipo personal de protección adecuado al trabajo.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069. Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del enjuague en el recipiente dosificador (constatar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforando o entet tando no dañar lo elegido al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción de fibra.

ALMACENAMIENTO: Conservar los envases no agotados y no inutilizados vacíos. Mantener el producto en lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos, fertilizantes, semillas, insecticidas y fungicidas. Mantener a temperaturas entre 5ºy 35ºC.

DERRAMES: En caso de producirse en un derrame tanto del producto puro como de caldo de aplicación, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, tierra, etc) recoger, barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados rotulados para su envío y posterior destrucción por empresas autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. **En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No reducir el vómito. Enjuague la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. **En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuague la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada **En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. **En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).
IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE (CATEGORÍA IV). No contiene elementos de No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No son específicos, por lo general se presentan como hipersensibilidad seguida de sedación.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.
CONSULTAS POR INTOXICACIONES: Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011)-4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-8080/1213. Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín -, Tel. (011)7950-8804 y 5950-8886. BUENOS AIRES: Hlaodo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5501 al 19 (int. 119203). CORDOBA. Hospital de Niños: Cumentes 543 Tel. (0351) 421-5303. ROSARIO. Hospital de Niños de Rosario Tel. (0341) 438-3535 o 481-3611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-8977 o 424-2727. MENDOZA. Hospital Central Tel. (0261) 423-4013.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la coexistencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezcla con otros herbicidas

NOCIVO

HERBICIDA
GRUPO 0

2.4D Controler EH

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

2,4-D: éster etilhexílico del ácido 2,4 diclorofenoxiacético	89 g (*)
solvente y emulsionantes c.s.p	100 cm³

(*) Equivalente en ácido 2,4 diclorofenoxiacético 59 % p/v

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA Nº 40431

Lote Nro.:

Industria Argentina

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto
20 Litros

NO INFLAMABLE

AGROFACIL
agrofacil@rinder.com.ar
Marconi 657
1812 Carlos Spegazzini
Pcia de Buenos Aires

Empresa inscripta en SENASA con el Nº: A-01226

ADVERTENCIA: El producto está elaborado bajo estrictas normas de calidad. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta desliinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.

NOCIVO

RECOMENDACIONES DE USO:
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 2,4 D CONTROLER EH es un herbicida selectivo de baja volatilidad, sistémico y de acción hormonal, destinado a combatir malezas de hoja ancha en dicotiledóneas cultivos. Por su baja volatilidad se recomienda para zonas críticas. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la deriva del producto.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Debe asperjarse con tamaños de gota gruesa a muy gruesa de la clasificación ASAE/ASABE: S572 3.3620. Se sugiere emplear boquillas, estrictivas dentro del rango de presión especificada por el fabricante. Consulte al catálogo del fabricante de boquillas para asegurar que entregue un tamaño buscado. En caso de ser necesario utilice surfactante.
Verifique que se obtenga la cantidad de gotas por centímetro cuadrado recomendado en la etiqueta. Se sugiere aplicar un volumen de caldo de 80-120 L/ha, pero no menos 70 L/ha, y velocidad de avance del pulverizador menor a 24 km/h. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la deriva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación.
Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 10 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8.
No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, se sugiere no pulverizar cuando el viento copie hacia cultivos sensibles* adyacentes al lote a pulverizar, cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).
Evitar residuos mezclas de tanques deformadas por el registrante, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas. No aplique **2,4D CONTROLER EH** con adhesivos, acondicionadores o fertilizantes que contengan aminas (p. ej., sulfato de amonio, nitrato de amonio, sus mezclas [AMS, AN, UAN]). Pequeñas cantidades de sulfato de amonio (AMS) pueden aumentar el potencial de volatilidad.

* Se consideran cultivos sensibles (girasol, algodón, poroto, soja no tolerante al **2,4 D**, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales en general, entre otros).

RECOMENDACIONES DE USO: Utilizar dosis inferiores contra malezas susceptibles, cuando sean pequeñas y en condiciones climáticas y suelo óptimas. Utilizar las dosis mayores cuando la maleza esté más desarrollada, o se trate de malezas tolerancia susceptibilidad. Respecto al cultivo en sí, utilizar **2,4 D CONTROLER EH** dentro de los estados vegetativos indicados en este rótulo.
Trigo: 550-600 cm3/ha. Pulverizar según la altura del tallo principal desde donde el tallo cambia de color blanco a verde hasta la lígula de la última hoja desarrollada.

Cultivo de trigo	Límite inferior (cm)	Límite superior (cm)
Cultivo ciclo corto	3.5 - 4	10 - 15
Cultivo ciclo largo	4.5 - 5	15 - 30

Cebada-Centeno: 550-600 cm3/ha. Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado
Avena: 450 a 500 cm3/ha. Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes de encañado.
Maíz y Sorgo: 550 a 650 cm3/ha. Pulverizar cuando las plantas alcancen 10 a 15 cm de altura. Cuando las plantas tengan más de 30 cm de altura, deberá usarse barra pulverizadoras con derivaciones descendentes a fin de no pulverizar el extremo apical de las plantas de cultivo. En ningún caso pulverizar durante la floración.
Mijo: 450 a 550 cm3/ha. Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.

Campos naturales de gramíneas: 800 a 1600 cm3/ha. Pulverizar cuando las malezas son pequeñas y crecen vigorosamente. En caso de requerirse un segundo tratamiento se aplicará el herbicida al producirse un rebrote.
Praderas artificiales de gramíneas: 550 a 800 cm3/ha. Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.
Caña de Azúcar: post-emergencia: 1100 a 2200 cm3/ha. Pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura. Pre-emergencia: 1600 a 2600 cm3/ha (o bien 33 a 52 cm3 por surco de 100 metros, luego de la siembra de la caña planta.
Arroz: 800 a 1300 cm3/ha. Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado.
Tratamiento de precosecha: En cereales finos, arroz, maíz, sorgo y lino para facilitar la cosecha mecánica, 1100 a 1600 cm3/ha cuando ha pasado el estado lechoso, y siempre que la maleza no esté próxima a cumplir su ciclo.
Caminos, alambrados y vías férreas: 1600 a 2600 cm3/ha. Aplicar con malezas pequeñas, en activo crecimiento. Si hiciera falta un segundo tratamiento, aplicar sobre los rebrotes en pleno crecimiento

MALEZAS MUY SUSCEPTIBLES
Abrepuño (Centaurea calcitrapa, C. solstitialis, C. melitensis); **Alfilerillo** (Erodium cilutarium); **Cardo asnal** (Silybum marianum); **Cardo crespo** (Cardusa pycnocephalus); **Cardo ruso** (Salsola kali); **Cerraja** (Sonchus olenaceus); **Diente de león** (Taraxacum oficinale); **Lengua de vaca** (Rumex crispus); **Llantén** (Plantago lanceolata); **Mostacilla** (Rapistrum rugosum); **Nabo** (Brassica campestris, B. napus); **Paragüita** (Hydrocotyle bonariensis), **Yuyo colorado** (Amaranthus spp); **Cardo pendiente** (Carduus nutans); **Abrojo** (Xanthium cavallines); **Correhuela** (Convolvus sativa); **Cardo** (Carduus acanthoides); **Cardo chileno** (Carthamus lanatus); **Cardo negro** (Cirsium vulgare); **Capa catallo** (Xanthium episosum); **Chamico** (Datura ferox); **Girasol/Ito y Santa María** (Verbedina encelioide); **Lupulina** (Medicago lupulina); **Morenita** (Kochia scoparia); **Mostaza** (Brassica nigra); **Nabón** (Raphanus sativus); **Quinoa** (Chenopodium album, Ch. Hircinum).

MALEZAS PARCIALMENTE SUSCEPTIBLES
Achicoria (Cychorium intybus); **Altamisa** (Ambrosia tenuifolia); **Vizaga** (Arrhi visnaga); **Cardo pampa** (Onopordon acanthium); **Cardo de castilla** (Cynara cardunculus); **Caapiqui** (stellaria media); **Cicuta** (Cirsium maculatum); **Correhuela ó campanilla** (Convolvus arvensis); **Chinchilla** (Tagetes minuta); **Enredadera** (polygonum convolvus); **Hueso de gallo** (Salpichroa origanifolia); **Laguinilla** (Alternanthera philoxeroides); **Manzanilla cimarrona** (Anthemis cotula); **Oreja de gato** (Dichondra repens); **Ortiga** (Urtica spp); **Radichata** (Hypochaeris brasiliensis); **Romerillo o sisa-sisa** (Baccharis coridifolia); **Rama negra** (Conza bonariensis); **Sanguinaria** (polygonum aviculare);**Trébol de olor** (Melilotus indicus); **Verdolaga** (Portulaca oleracea); **Madreselva** (Lonicera sempervirens); **Yuyo San Vicente** (Artemisa verotorum); **Yuyo sapo ó Sunchillo** (Wedelia glauca).

RESTRICCIONES DE USO:
Período de carencia: Dejar transcurrir entre la aplicación y la cosecha mecánica ó animal los siguientes períodos: Alpiste, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y trigo (todos como grano): 20 días. Cereales de invierno: trigo, mijo, cebada, centeno, maíz, avena, sorgo, alpiste (todos como forraje): 7 días. Campos naturales y praderas artificiales, caña de azúcar: 7 días.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de aplicado el producto.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
COMPATIBILIDAD: Es compatible en mezclas de tanque con picloram.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se respetan las dosis y recomendaciones de este rótulo.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

NOCIVO