

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.
En caso de inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado o con suero fisiológico, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera. Remover lentes de contacto si hubiera. Luego acudir por oftalmólogo.
En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Produce irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No son específicos, por lo general se presentan como mareos y/o náuseas.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Conmutador: 4962-8280 / 9212. **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín** - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES:** Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinico Prof. A. Posadas Tel. (011) 4654-6848 y 4658-7777. Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA:** Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel. (0351) 421-5303. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel. (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel. (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.



CUIDADO

RECOMENDACIONES DE USO GENERALIDADES DEL PRODUCTO: DIFLU 50 RINDER Es un herbicida que controla malezas de hoja ancha en aplicación pre-emergente en el cultivo de girasol y post-emergente en pasturas y barbecho químico. Las malezas afectadas muestran una marcada decoloración y mueren en un plazo de 5 días. La principal vía de absorción en las malezas es por vía hipocótilo. INSTRUCCIONES PARA EL USO Preparación: Se aconseja antes de agregar al tanque de la pulverizadora, mezclar DIFLU 50 RINDER en un recipiente con agua agitando la mezcla, luego agregar el contenido al tanque de la pulverizadora a medio llenar, ya cargado con el agroquímico. Completar luego el volumen con agua manteniendo en funcionamiento los agitadores y comenzar la pulverización. EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Calibrar el equipo aplicador con el fin de tener una aspersión uniforme en todos los picos y el volumen y presión deseados. Emplear un volumen entre 80 y 130 lts de caldo/ha. Se recomienda el uso de pastillas del tipo abanico plano estándar ó XR 8002 u 8003 y una presión de 35 a 50 libras/pulg². Es aconsejable lograr como mínimo de 20 a 30 impactos/cm².	<table> <tr> <th>Cultivo</th><th>Plaga</th><th>Dosis</th><th>Momento de Aplicación</th></tr> <tr> <td>Pasturas puras o consociadas de gramíneas y leguminosas</td><td>Abrepunio (Centaurea solstitial), Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Apio cimarrón (Ammimajus), Biznaga (Ammi visnaga), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Borraja (Licopsis arvensis), Boulesia (Bowlesia incana), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Cardos (Carduus sp.), Cerraja (Sonchus oleraceus), Enredadera (Polygonum convolvulus), Girasol guacho (Helianthus annuus), Lengua de vaca (Rumex crispus), Llantén (Plantago lanceolata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Viola (Viola arvensis), Vira Vira (Gnaphalium spp.)</td><td>100 cm³/ ha</td><td>Aplicar desde la tercer hoja trifoliada de las leguminosas, a partir del primer macollo en las gramíneas. Aplicar sólo en mezcla con: • Flumetsulam: 100 a 200 cm³/ha ó • 2,4 DB (sal amina): 700 cm³/ha ó • Bromoxinil: 700 cm³/ha</td></tr> </table>	Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación	Pasturas puras o consociadas de gramíneas y leguminosas	Abrepunio (Centaurea solstitial), Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Apio cimarrón (Ammimajus), Biznaga (Ammi visnaga), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Borraja (Licopsis arvensis), Boulesia (Bowlesia incana), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Cardos (Carduus sp.), Cerraja (Sonchus oleraceus), Enredadera (Polygonum convolvulus), Girasol guacho (Helianthus annuus), Lengua de vaca (Rumex crispus), Llantén (Plantago lanceolata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Viola (Viola arvensis), Vira Vira (Gnaphalium spp.)	100 cm ³ / ha	Aplicar desde la tercer hoja trifoliada de las leguminosas, a partir del primer macollo en las gramíneas. Aplicar sólo en mezcla con: • Flumetsulam: 100 a 200 cm ³ /ha ó • 2,4 DB (sal amina): 700 cm ³ /ha ó • Bromoxinil: 700 cm ³ /ha								
Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación														
Pasturas puras o consociadas de gramíneas y leguminosas	Abrepunio (Centaurea solstitial), Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Apio cimarrón (Ammimajus), Biznaga (Ammi visnaga), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Borraja (Licopsis arvensis), Boulesia (Bowlesia incana), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Cardos (Carduus sp.), Cerraja (Sonchus oleraceus), Enredadera (Polygonum convolvulus), Girasol guacho (Helianthus annuus), Lengua de vaca (Rumex crispus), Llantén (Plantago lanceolata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Viola (Viola arvensis), Vira Vira (Gnaphalium spp.)	100 cm ³ / ha	Aplicar desde la tercer hoja trifoliada de las leguminosas, a partir del primer macollo en las gramíneas. Aplicar sólo en mezcla con: • Flumetsulam: 100 a 200 cm ³ /ha ó • 2,4 DB (sal amina): 700 cm ³ /ha ó • Bromoxinil: 700 cm ³ /ha														
RECOMENDACIONES DE USO <table> <tr> <th>Cultivo</th><th>Plaga</th><th>Dosis</th><th>Momento de Aplicación</th></tr> <tr> <td>Girasol</td><td>Nabo (Brassica campestris), Nabón (Raphanus sativus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Chamico (Datura ferox), Yuyo colorado (Amaranthus spp.), Quinoa (Chenopodium album), Verdolaga (Portulaca oleracea), Chinchilla (Tagetes minuta), Moco de pavo (Polygonum persicaria), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Malva (Anoda cristata).</td><td>Ver M.A.</td><td>Suelos livianos: 250 cm³ / ha. Suelos medianos: 300 cm³ / ha. Suelos pesados: 350 cm³ / ha Para obtener un control de gramíneas, también se aconseja la mezcla con Metolaclor 96%, 1,2 l/ha, Trifluralina 60% fotoestable, 2,1 l/ha o acetoclor 1l/ha.</td></tr> </table>	Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación	Girasol	Nabo (Brassica campestris), Nabón (Raphanus sativus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Chamico (Datura ferox), Yuyo colorado (Amaranthus spp.), Quinoa (Chenopodium album), Verdolaga (Portulaca oleracea), Chinchilla (Tagetes minuta), Moco de pavo (Polygonum persicaria), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Malva (Anoda cristata).	Ver M.A.	Suelos livianos: 250 cm ³ / ha. Suelos medianos: 300 cm ³ / ha. Suelos pesados: 350 cm ³ / ha Para obtener un control de gramíneas, también se aconseja la mezcla con Metolaclor 96%, 1,2 l/ha, Trifluralina 60% fotoestable, 2,1 l/ha o acetoclor 1l/ha.	<table> <tr> <th>Cultivo</th><th>Plaga</th><th>Dosis</th><th>Momento de Aplicación</th></tr> <tr> <td>Barbecho Químico</td><td>Abrepunio amarillo (Centaurea solstitial), Albahaca silvestre Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Canchalagua (Veronica persica), Cardo ruso (Salsola kali), Chamico (Datura ferox), Chinchilla (Tagetes minuta), Enredadera (Polygonum convolvulus), Escoba dura (Sida spinosa), Lengua de vaca (Rumex crispus), Malva (Anoda cristata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Morenita (Kochia scoparia), Mostacilla(Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga (Urtica urens), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Pensamiento silvestre (Viola arvensis), Perejillo (Bowlesia spp.), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Verdolaga (Portulaca oleracea), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)</td><td>150 – 200 cm³ / ha</td><td>Aplicar en mezcla con 2,5 l/ha de glifosato al 48% Para mejorar el control de cardos, se recomienda añadir 0,5 – 0,6 lt/ha de 2,4- D al 100%. Residualidad: Soja y maíz: desde 60 días hasta 15 días previos a la siembra, Girasol: desde 60 días hasta preemergencia, suspendiendo el uso de 2,4 D 15 días antes de la siembra</td></tr> </table>	Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación	Barbecho Químico	Abrepunio amarillo (Centaurea solstitial), Albahaca silvestre Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Canchalagua (Veronica persica), Cardo ruso (Salsola kali), Chamico (Datura ferox), Chinchilla (Tagetes minuta), Enredadera (Polygonum convolvulus), Escoba dura (Sida spinosa), Lengua de vaca (Rumex crispus), Malva (Anoda cristata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Morenita (Kochia scoparia), Mostacilla(Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga (Urtica urens), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Pensamiento silvestre (Viola arvensis), Perejillo (Bowlesia spp.), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Verdolaga (Portulaca oleracea), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)	150 – 200 cm ³ / ha	Aplicar en mezcla con 2,5 l/ha de glifosato al 48% Para mejorar el control de cardos, se recomienda añadir 0,5 – 0,6 lt/ha de 2,4- D al 100%. Residualidad: Soja y maíz: desde 60 días hasta 15 días previos a la siembra, Girasol: desde 60 días hasta preemergencia, suspendiendo el uso de 2,4 D 15 días antes de la siembra
Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación														
Girasol	Nabo (Brassica campestris), Nabón (Raphanus sativus), Mostacilla (Rapistrum rugosum), Chamico (Datura ferox), Yuyo colorado (Amaranthus spp.), Quinoa (Chenopodium album), Verdolaga (Portulaca oleracea), Chinchilla (Tagetes minuta), Moco de pavo (Polygonum persicaria), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Malva (Anoda cristata).	Ver M.A.	Suelos livianos: 250 cm ³ / ha. Suelos medianos: 300 cm ³ / ha. Suelos pesados: 350 cm ³ / ha Para obtener un control de gramíneas, también se aconseja la mezcla con Metolaclor 96%, 1,2 l/ha, Trifluralina 60% fotoestable, 2,1 l/ha o acetoclor 1l/ha.														
Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación														
Barbecho Químico	Abrepunio amarillo (Centaurea solstitial), Albahaca silvestre Algodonosa / peludilla (Gamochoaeta sp.), Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), Caapiquí (Stellaria media), Calabacilla (Silene gallica), Canchalagua (Veronica persica), Cardo ruso (Salsola kali), Chamico (Datura ferox), Chinchilla (Tagetes minuta), Enredadera (Polygonum convolvulus), Escoba dura (Sida spinosa), Lengua de vaca (Rumex crispus), Malva (Anoda cristata), Manzanilla (Anthemis cotula), Mastuerzo (Coronopus didymus), Morenita (Kochia scoparia), Mostacilla(Rapistrum rugosum), Nabo/Nabón (Brassica/Raphanus), Ortiga (Urtica urens), Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), Pensamiento silvestre (Viola arvensis), Perejillo (Bowlesia spp.), Quinoa (Chenopodium album), Rama negra (Conyza bonariensis), Sanguinaria (Polygonum aviculare), Verdolaga (Portulaca oleracea), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)	150 – 200 cm ³ / ha	Aplicar en mezcla con 2,5 l/ha de glifosato al 48% Para mejorar el control de cardos, se recomienda añadir 0,5 – 0,6 lt/ha de 2,4- D al 100%. Residualidad: Soja y maíz: desde 60 días hasta 15 días previos a la siembra, Girasol: desde 60 días hasta preemergencia, suspendiendo el uso de 2,4 D 15 días antes de la siembra														
RESTRICCIONES DE USO: No reingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. COMPATIBILIDAD: DIFLU 50 RINDER es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. Ante cualquier tipo de mezclas consultar con su Ingeniero Agrónomo. FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO. PRECAUCIONES: • MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS • EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. • EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. • PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa con protección, guantes y máscara a prueba de agua, anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero. No comer ni beber al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de su uso. RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.	RESTRICCIONES DE USO: No reingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. COMPATIBILIDAD: DIFLU 50 RINDER es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. Ante cualquier tipo de mezclas consultar con su Ingeniero Agrónomo. FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO. PRECAUCIONES: • MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS • EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. • EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. • PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa con protección, guantes y máscara a prueba de agua, anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero. No comer ni beber al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de su uso. RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.																